R_X - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

DIỆP HẠ CHÂU KH

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần (cho 1 viên nang cứng):

Thành phần dược chất:

Cao khô diệp hạ châu *(Extractum Herba Phyllanthi urinariae)* ..... 300,0 mg

Tương đương với dược liệu diệp hạ châu *(Herba Phyllanthi urinariae)* ..... 3000,0 mg

Thành phần tá dược: Amidon, Lactose, Talc, Magnesi stearat, Natri benzoat ...vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, một đầu màu xanh lá cây đậm, một đầu màu xanh lá cây nhạt, bên trong chứa bột thuốc màu nâu nhạt, mùi thơm dược liệu, vị đắng.

Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Tiêu độc, hoạt huyết, lợi mật, thanh can, lợi thủy.
- **Chỉ định:** Điều trị viêm gan hoàng đản, viêm họng, mụn nhọt, viêm dây thần kinh, chàm, viêm thận, phù thũng, sỏi tiết niệu, viêm ruột, tiêu chảy.

Liều dùng – Cách dùng:

- Người lớn mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2-3 lần sau bữa ăn.
- Trẻ em mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai
- Người thể hàn
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Người bị tiêu chảy, người bị bệnh ưa chảy máu cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- Thận trọng dùng cho phụ nữ đang bị rối loạn kinh nguyệt, người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng nặng, nam giới có ý định sinh con

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác: Tránh dùng đồ ăn sống, chất kích thích... khi đang dùng thuốc
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Tác dụng phụ có thể gặp như buồn nôn nhẹ, chán ăn, khó chịu vùng thượng vị.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 01 lọ x 45 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 60 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 100 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 03 vỉ nhôm/PVC x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 05 vỉ nhôm/PVC x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ nhôm/PVC x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 03 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 05 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà.

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 – Fax: 0227.3641548

Thái Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2018

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khải

TUQ CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy