15

0508

Rx- Thuốc bán theo đơn

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DESMODIPS

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

"Để xa tầm tay trẻ em"

"Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Công thức bào chế cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Hoạt chất	Hàm lượng
Mỗi viên nang cứng chứa 125mg cao hỗn hợp dược liệu quy về khô (tỷ lệ cao hỗn hợp quy về khô so với dược liệu là 1/16):	
Kim tiền thảo *(Herba Desmodii styracifolii)*	1000mg
Râu ngô *(Styli et stigmata Maydis)*	1000mg
Tá dược: Bột talc, magnesi stearate, natri benzoate vừa đủ 1 viên.	

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, hai đầu màu xanh đậm- xanh nhạt, cốm thuốc bên trong màu nâu xám, mùi thơm dược liệu, vị đắng.

Qui cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 1 lọ 60 viên.

Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Tác dụng: Thanh nhiệt, tiêu viêm, thông lâm lợi tiểu.

Chỉ định: Điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản và sỏi mật. Phối hợp điều trị viêm bể thận, viêm túi mật. Dùng trong trường hợp phù thũng, đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần.

Liều dùng: Người lớn: mỗi lần uống 2-3 viên. Ngày uống 2-4 lần.

Liệu trình điều trị theo sự hướng dẫn của bác sỹ.

Đường dùng: Đường uống.

Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội. Uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Trẻ em dưới 10 tuổi.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người bị tỳ hư, tiêu chảy.

Người hư hàn, đái dầm.

Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: "Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc".

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12./.04./.2023

Trường hợp quên không dùng thuốc một lần thì cứ tiếp tục dùng liều tiếp theo, không cần bù liều.

Bảo quản thuốc: Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về thuốc có ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương kỵ của thuốc: Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kị của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

Tương tác thuốc: "Chưa có tài liệu báo cáo".

Quá liều và cách xử lý: "Không có dữ liệu về việc sử dụng quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Trường hợp sử dụng quá liều cần theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường báo ngay với bác sỹ hoặc dược sỹ".

Trường hợp dùng quá liều khuyến cáo thì nên theo dõi tình trạng người bệnh tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Các trường hợp có triệu chứng bất thường thì nên ngưng dùng thuốc và theo sự tham vấn bác sỹ, dược sỹ. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Dùng thuốc không quá 30 ngày kể từ khi mở nắp.

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM PHƯỚC SANH PHARMA

ĐC: 272C, Khu 3, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Ngày xem xét sửa đổi: ....-....-....

Long An, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc

M.S.D.N: 1101744342 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PHƯỚC SANH PHARMA - H. ĐỨC HÒA - T. LONG AN

Trương Vũ Khánh

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM - CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN - BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/04/2023